


Introduction

L'OMS mentionne qu'environ 15% des adultes âgés de 60 ans et plus, souffrent d'un trouble mental. Certaines études estiment que ce sont plus de la moitié des sujets de plus de 65 ans qui souffriraient d'un trouble psychiatrique (Rigaud et al. 2005). Ces constats amènent à se poser la question des hospitalisations pour cette population : « quelle est la qualité de leur Alliance Thérapeutique (AT) avec les équipes hospitalières ? », « quels sont les effets de cette AT sur l'observance? »



Objectif principal

L'objectif principal de notre recherche a été de mesurer le score d'**Alliance thérapeutique** (AT) entre les personnes hospitalisées en psychiatrie en fonction de leur âge : les plus de 60 ans versus les 60 ans et moins, et les équipes infirmières.




Méthodologie

Recherche interventionnelle à risques et contraintes minimales (**RIRCM**) avec méthodologie quantitative multicentrique. L'enquête s'est déroulée de juillet 2015 à octobre 2017 sur les quatre sites parisiens d'hospitalisation de l'EPS Maison Blanche.

Financement: DGOS/**PHRIP 2013**.

Utilisation de l'échelle STAR-P (McGuire-Snieckus et al.) traduite par nous.


Analyse statistique : URC Paris Nord



Résultats

Les données socio-démographiques

240 personnes ont accepté de participer à notre étude (de 21 ans à 83 ans) dont 41 personnes de 60 ans et plus et 199 de moins de 60 ans. 54,2% sont des hommes (N=130) et 45,8% de femmes (N=110). Pour les 60 ans et plus 48,8% (N=20) sont des hommes.



Score total de STAR-P	N	240	199 (60 ans et -)	41 (+ de 60 ans)	(S) p = 0.27
Minimum / Maximum		7 / 48	7 / 48	18 / 48	
Médiane [IQR]		34.0 [29.0-39.0]	34.0 [28.0-39.0]	33.5 [31.0-39.0]	
Moyenne (std)		33.4 (7.8)	33.2 (8.1)	34.7 (6.4)	

Les 3 différences significatives :

1° Différence entre nos deux populations (p-valeur égal à 0.045). 65,9% des répondants de 60 ans et plus **ont été admis en soins libres** et ce pourcentage augmente à 66,7% pour les plus de 65 ans).

2° Différence sur la venue au Centre-Médico-Psychologique à l'issue de l'hospitalisation (p valeur = 0.027). **97,4% des 60 ans et plus se présentent à leur premier rendez-vous de suivi ambulatoire.**

3° Différence sur l'usage des substances psycho-actives (p-valeur inférieur à 0.032) entre nos deux populations. En effet, on la retrouve dans 34,9% des cas pour les moins de 60 ans mais elle n'est plus que de 8,3% (N = 1) pour les 60 ans et plus et le diagnostic de l'humeur qui apparaît dans 25% des cas chez les 60 ans et plus, alors qu'il n'est que de 7,9% pour les moins de 60 ans.



Discussion

Les personnes de 60 ans et plus qui ont été hospitalisées en psychiatrie générale présentent une bonne alliance thérapeutique avec les équipes infirmières et elles se rendent davantage à leur premier RDV de suivi ambulatoire post-hospitalisation, que les moins de 60 ans. Ces deux indicateurs permettent de penser que cette population s'inscrit majoritairement dans les soins.

(1), RN, PhD (s), Maître d'enseignement à la Haute école de santé de Genève, Suisse et doctorant, université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Chaire Recherche Sciences Infirmière, Laboratoire Educations et Pratiques de Santé (LEPS), (EA 3412), UFR SMBH, F-93017. Bobigny, France, (2) RN, PhD (s), Laboratoire Educations et Pratiques de Santé (LEPS), (EA 3412), UFR SMBH, F-93017, Bobigny.(3) PhD, Epidémiologiste EPS Maison Blanche (4) RN, PhD, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Chaire Recherche Sciences infirmière, Laboratoire Educations et Pratiques de Santé (LEPS), (EA 3412), UFR SMBH, F-93017, Bobigny. Chargé de Projets et de Recherche à Gerond'IF (France).

jean-manuel.morvillers@gerondif.org